

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/biofaktor-citroenzymix-preparat-poprawiajacy-trawienie-dla-psow-100ml-p-955.html>



BIOFAKTOR CITROENZYMIX preparat poprawiający trawienie dla psów 100ml

Cena	17,00 zł
Dostępność	Niedostępny - pytaj obsługi
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BIOFAKTOR

Opis produktu

Citroenzymix 100ml - preparat poprawiający trawienie dla psów 100ml

producent: Biofaktor

Właściwości i działanie:

Pepsyna jest enzymem wydzielanym w żołądku gruczołowym lub przez komórki główne gruczołów właściwych żołądka ssaków. Enzym ten jest endopeptydazą niezbędną do prawidłowego trawienia białek w organizmie. Rozkłada duże cząstki białek na mniejsze fragmenty, które następnie są trawione w jelitach przez proteazy soku jelitowego. Pepsyna stosowana w niewielkich ilościach pobudza apetyt oraz poprawia procesy trawienne. Bufor fosforanowo-cytrynianowy stabilizuje kwasowość treści żołądkowej i przyczynia się do aktywacji naturalnych proteaz. Pobudzenie łaknienia przez enzymy stosowane doustnie polega nie tylko na przyspieszeniu procesów trawiennych i pasażu jelitowego, ale również na uruchomieniu wielu mechanizmów związanych z wydzielaniem hormonów jelitowych i pośredniego oddziaływania przewodu pokarmowego na ośrodki głodu i sytości znajdujące się w podwzgórze. Połączenie pepsyny z buforem cytrynianowym jest uzasadnione tym, że pepsyna wykazuje swoją aktywność tylko w środowisku o kwasowości pomiędzy pH 1 a 3, a dzięki kombinacji składników preparatu utrzymuje on kwasowość na poziomie 2.0. W środowisku obojętnym szybko traci aktywność. Dodatkowo zastosowane w preparacie podłoże ułatwia doprowadzenie pH środowiska żołądka do wartości odpowiedniej dla aktywacji naturalnie wydzielanych proteaz, co w konsekwencji wzmacnia działanie preparatu.

Skład:

Pepsyna 1,0
Bufor fosforanowo-cytrynianowy i dodatki smakowe do 1000,0

Wskazania:

Citroenzymix stosuje się celem poprawy apetytu i procesów trawiennych.

Dawkowanie:

Citroenzymix podaje się w następujących ilościach:

Psy:

od 2 do 5 ml na zwierzę bezpośrednio doustnie przed posiłkiem lub w wodzie do picia, do trzech razy dziennie.

Zaleca się podawać preparat początkowo przez okres 10 dni, a jeśli po jego odstawieniu apetyt ulegnie zmniejszeniu można kontynuować podawanie preparatu przez następnych 10 dni.

Trwałość:

18 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze pokojowej.