

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/tabletka-na-odrobaczenie-dla-psa-ceva-cestal-plus-1-sztuka-op-zastepcze-p-4264.html>



## Tabletka na odrobaczenie dla psa Ceva CestaL Plus 1 sztuka (op. zastępcze)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4,99 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>605779</b>        |
| Kod producenta   | <b>5903707100873</b> |
| Kod EAN          | <b>5903707100873</b> |

### Opis produktu

#### Tabletka na odrobaczenie dla psa Ceva CestaL Plus 1 sztuka (op. zastępcze) 50 mg + 144 mg + 200 mg

Środek przeciwpasożytniczy CestaL dla psa o szerokim spektrum działania. Przeznaczony do leczenia i kontroli inwazji wszystkich powszechnie występujących pasożytów żołądkowo-jelitowych, w tym: - tasiemce: Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (formy dojrzałe i późne niedojrzałe) - glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (formy dojrzałe i niedojrzałe) - tęgoryjce: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala - włosogłówek: Trichuris vulpis.

**Przeciwwskazania:** Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

- **waga psa** 2-5 kg = 1/2 tabletki
- 5-10 kg = 1 tabletka
- 10-20 kg = 2 tabletki
- 20-30 kg = 3 tabletki
- 30-40 kg = 4 tabletki
- 40-50 kg = 5 tabletek

#### Opakowanie zawiera 2 tabletki.

Podanie doustne.

Tabletki należy podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po wymieszaniu z karmą ( np. z pasztetem itp.). Produkt może być stosowany bez uprzedniej głodówki. Przy odrobaczaniu profilaktycznym jednokrotne podanie jest wystarczające. Jednakże w przypadku silnej inwazji (tj. występowanie objawów klinicznych ze strony przewodu pokarmowego – biegunka, wymioty, obecność pasożytów w kale, wymiocinach, pogorszenie wyglądu sierści) odrobaczanie należy powtórzyć po 14 dniach. Z powodu istnienia ryzyka reinwazji zwierzęta należy odrobaczać co 3 miesiące. W przypadku długotrwałego stosowania produktu wskazane jest okresowe wykonywanie badania koproskopowego w celu oceny skuteczności leczenia.

Podmiot odpowiedzialny: Ceva